
NUMÉRO : 6.11

TITRE : Poux de tête

Les poux de tête sont fréquents chez les enfants d'âge scolaire. La meilleure façon de limiter la transmission des poux repose sur la collaboration entre les parents, les enfants, les écoles et les fournisseurs de soins de santé. Une fois que les parents ont appris à reconnaître les poux, ils doivent régulièrement examiner leurs propres cheveux et ceux de leur enfant à titre de prévention.

Le symptôme le plus courant est la démangeaison incessante du cuir chevelu. Parmi les autres symptômes, on trouve les traces de grattage ou de petites lésions rouges, semblables à une éruption cutanée. Certains enfants porteurs de poux de tête ne présentent aucun symptôme.

Les poux de tête ne provoquent pas de maladie, mais ils se propagent facilement d'une personne à une autre. La transmission des poux de tête se fait par des contacts directs de tête à tête, le plus souvent entre enfants ou adultes regroupés dans un même lieu, comme dans les garderies ou les écoles. Les poux de tête ne peuvent pas sauter ou voler d'une personne à l'autre, mais ils peuvent se déplacer très rapidement.

La découverte de poux de tête peut être une expérience embarrassante pour les élèves. Parlez-en seulement aux personnes qui sont directement touchées par les poux de tête. Une fois que la présence des poux de tête est confirmée, veuillez en informer les parents ou les tuteurs.

Si un cas de poux est détecté à votre école, veuillez suivre la procédure suivante :

1. Lorsque le premier cas de poux est constaté dans une salle de classe :
 - a) Le directeur avise les parents des élèves de la classe par lettre.
 - b) Le directeur informe le parent de l'élève porteur de poux que ce dernier est tenu de rester à la maison jusqu'à ce qu'il reçoive son premier traitement. Une fois traité, l'enfant pourra retourner à l'école.

Date de création : 1^{er} octobre 2013
Mise à jour : 20 janvier 2015

Documents annexés : Lettre aux parents « A »
Lettre aux parents « B »
Poux de tête – Fiche documentaire
Poux de tête – Ministère de la Santé et des Services sociaux du Yukon
Traitement des poux de tête

2. Si un autre cas de poux survient dans cette classe dans les deux semaines qui suivent :
- a) Le directeur avise les parents des élèves de la classe par lettre et diffuse un avis à l'échelle de l'école.
 - b) Les membres du personnel signalent au directeur de tout cas de poux de tête.
 - c) Les frères et sœurs des élèves touchés qui fréquentent la même école sont aussi examinés.

Renseignements sur le dépistage à l'école

On peut recourir au dépistage à l'école si l'on soupçonne fortement qu'un enfant ou ses frères et sœurs sont porteurs de poux.

Voici des renseignements utiles pour les écoles qui effectuent un dépistage auprès d'élèves présumés porteurs de poux ou de leurs frères et sœurs :

Pour vérifier le cuir chevelu de l'élève, un bon éclairage est indispensable. Séparez les cheveux en petites sections, d'un côté à l'autre de la tête, avec vos doigts ou un peigne fin conçu pour attraper les poux. Vérifiez toute la tête, surtout près du cuir chevelu. Il peut être plus facile de trouver des poux vivants ou des lentes derrière les oreilles et à la naissance des cheveux juste au-dessus de la nuque.

- Respectez les parents ou les élèves qui ne souhaitent pas être examinés.
- Ne touchez jamais aux cheveux d'un élève ou à ce qu'il porte sur la tête sans son consentement.

Ressources éducatives et de soutien

Fiche « Les poux de tête » publiée par l'organisme HealthLinkBC

<http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/hfile06.stm>

Renseignements sur les poux de tête publiés sur le site *IdentifyUs* du D^r Richard Pollack

<https://identify.us.com/idmybug/head-lice/head-lice-documents/index.html>

Société canadienne de pédiatrie – Les poux de tête

http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/head_lice

Date de création : 1^{er} octobre 2013

Mise à jour : 20 janvier 2015

Documents annexés : Lettre aux parents « A »
Lettre aux parents « B »
Poux de tête – Fiche documentaire
Poux de tête – Ministère de la Santé et des Services sociaux du Yukon
Traitement des poux de tête